



TRATAMIENTO / TAREA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SERVICIO												
PARICIÓN												
DESTETE												
TÁCTO												

CATEGORÍA	CANTIDAD	TRATAMIENTO / TAREA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
VACUNAS															
Vacas		BIOABORTOGEN® H / BIOLEPTOGEN®			2° dosis						1° dosis				Enf. Reproductivas / Leptospirosis Preservicio / IATF y al tacto
		ROTATEC J5®					1° dosis	2° dosis							Diarrea Neonatal de los Terneros Pre parto
		BIO-CARBOGEN® 2									Dosis anual				Carbunco
		BIOAFTOGEN®			Dosis 1° campaña										Según Plan Nacional
Vaquillonas		BIOABORTOGEN® H / BIOLEPTOGEN®			Refuerzo					1° dosis	2° dosis				Enf. Reproductivas / Leptospirosis Preservicio / IATF y al tacto
		ROTATEC J5®					1° dosis	2° dosis							Diarrea Neonatal de los Terneros Pre parto
		BIO-CARBOGEN® 2									Dosis anual				Carbunco
		BIOAFTOGEN®			Dosis 1° campaña						Dosis 2° campaña				Según Plan Nacional
Toros		BIOABORTOGEN® H / BIOLEPTOGEN®								1° dosis	2° dosis				Enf. Reproductivas / Leptospirosis Preservicio / IATF y al tacto
		BIO-CARBOGEN® 2									Dosis anual				Carbunco
		BIOAFTOGEN®			Dosis 1° campaña										Según Plan Nacional
Terneros/as al pie		BIOPOLIGEN HS® / BIOPOLIGEN AIR®	1° dosis	2° dosis											Complejo Respiratorio
		BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML/ POLICLOSTRIGEN®	1° dosis	2° dosis											Enf. Clostridiales
		BIOQUERATOGEN® OLEO MAX	1° dosis	2° dosis											Queratoconjuntivitis
		BIOLEPTOGEN®	1° dosis	2° dosis											Leptospirosis
		BIOAFTOGEN®			Dosis 1° campaña						Dosis 2° campaña				Según Plan Nacional
CONTROL DE PARÁSITOS															
Vacas		ARRASA® / ACIENDEL® / ACIENDEL® PLUS / ASPERSÍN®		Dosis moscas			Dosis piojos							Dosis moscas	Parásitos Externos según diagnóstico
Vaquillonas		BAGOMECTINA® / FLOK® 1,1 % / FLOK® 3,15 %											Dosis		Parásitos Internos (Ostertagia inhibida)
		PARAXANE® INY.									Dosis				Parásitos Internos antes del 2° servicio
Toros		ARRASA® / ACIENDEL® / ACIENDEL® PLUS / ASPERSÍN®		Dosis moscas			Dosis piojos							Dosis moscas	Parásitos Externos según diagnóstico
		BAGOMECTINA® / FLOK® 1,1 % / FLOK® 3,15 %					Dosis				Dosis				Parásitos Internos y Externos antes y después del servicio
Terneros/as al pie		ARRASA® / ACIENDEL® / ACIENDEL® PLUS / ASPERSÍN®		Dosis moscas			Dosis piojos							Dosis moscas	Parásitos Externos según diagnóstico
		BAGOMECTINA® / FLOK® 1,1 % / FLOK® 3,15 %			Dosis destete										Parásitos Internos y Externos al destete
SUPLEMENTACIÓN VITAMÍNICA MINERAL															
Vacas		ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT									Dosis				Vitaminas y minerales Pre servicio
		SUPLENU®			Dosis			Dosis							Cobre + Zinc al Tacto y Pre parto
Vaquillonas		ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT									Dosis				Vitaminas y minerales Pre servicio
		SUPLENU®			Dosis			Dosis							Cobre + Zinc al Tacto y Pre parto
Toros		ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT									Dosis				Vitaminas y minerales Pre servicio
		SUPLENU®			Dosis		Dosis								Cobre + Zinc
Terneros/as al pie		ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT			Dosis destete						Dosis				Vitaminas y minerales al Destete
		SUPLENU®		2° dosis									1° dosis		Cobre + Zinc al pie de la madre

Plan Sanitario sugerido para un rodeo de cría (Vacas, Vaquillonas de 1° parto, Toros y Terneros al pie de la madre).
 La elección de productos para el control de parásitos tanto internos como externos quedara sujeta a criterio profesional veterinario y a los antecedentes de fallas en los tratamientos o resistencia a los distintos principios activos del establecimiento.
 De acuerdo a los productos seleccionados para el control de parásitos externos, por baños pour on o aspersion, se deberá repetir el tratamiento según ciclo del parásito a controlar.
 Se debe realizar anualmente diagnóstico de brucelosis y tuberculosis del rodeo.

El diseño definitivo del Plan Sanitario Productivo, quedará a criterio del Asesor Veterinario según necesidades del establecimiento.