



GUACHERA (Primera dosis 45 días de vida, segunda dosis 21 o 28 días posteriores, idealmente una semana antes de salir a recría 1)	
BIOPOLIGEN® HS / AIR	1° y 2° dosis
BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML / POLICLOSTRIGEN	1° y 2° dosis
BIOQUERATOGEN® OLEO MAX	1° y 2° dosis
BIOLEPTOGEN®	1° y 2° dosis
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	Al pasar a recría
FLOK® 1,1%	Al ingreso

RECRÍA 1	
BIOPOLIGEN® HS / AIR®	1° refuerzo
BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML / POLICLOSTRIGEN®	1° refuerzo
BIOQUERATOGEN® OLEO MAX	1° refuerzo
BIOLEPTOGEN®	1° refuerzo
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	Al pasar a recría 2
ARRASA®	Según necesidad
BAGOMECTINA® / FOSFAMISOL® M.V. / PARAXANE® INY.	Según necesidad

RECRÍA 2	
BIOPOLIGEN® HS / AIR®	2° refuerzo
BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML / POLICLOSTRIGEN®	2° refuerzo
BIOQUERATOGEN® OLEO MAX	2° refuerzo
BIOLEPTOGEN®	2° refuerzo
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	Al pasar a recría 3
ARRASA®	Según necesidad
BAGOMECTINA® / FOSFAMISOL® M.V. / PARAXANE® INY.	Según necesidad

RECRÍA 3	
BIOABORTOGEN® H	1° dosis
BIO-CARBOGEN® 2	Dosis anual
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	Al pasar a servicio
ARRASA®	Según necesidad
BAGOMECTINA® / FOSFAMISOL® M.V. / PARAXANE® INY.	Según necesidad

VAQUILLONAS EN SERVICIO	
BIOABORTOGEN® H	2° dosis preservicio
BIO-CARBOGEN® 2	Dosis anual
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	Al servicio-IATF
ARRASA®	Según necesidad
BAGOMECTINA® / FOSFAMISOL® M.V. / PARAXANE® INY.	Según necesidad

SECADO/ VAQ 1° LACT	
ROTATEC J5®	1° dosis
BIOENTEROTEC®	1° dosis
BIOPOLIGEN® AIR	1° dosis
BIO-CARBOGEN® 2	Dosis anual
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	1° dosis
ARRASA®	Según necesidad
BAGOMECTINA® / FOSFAMISOL® M.V. / PARAXANE® INY.	Según necesidad
UBRESAN® SEC	Al secado
UBRESAN® SELL	Al secado

PRE-PARTO	
ROTATEC J5®	2° dosis
BIOENTEROTEC®	2° dosis
BIOPOLIGEN® AIR	2° dosis
BIO-CARBOGEN® 2	Dosis anual
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	2° dosis
ARRASA®	Según necesidad

VACA ORDEÑO	
ROTATEC J5®	3° dosis en fresca, mastitis ambiental x EC
BIOABORTOGEN® H	1 dosis al liberar a servicio y refuerzo cada 6 meses
BIO-CARBOGEN® 2	Dosis anual
ADAPTADOR® VIT Y ADAPTADOR® MIN	3° dosis
ARRASA®	Según necesidad

OBSERVACIONES SANITARIAS PARTICULARES:

- Aplicación de Tuberculina (según plan nacional)
- Brucelosis (según plan nacional)
- Aftosa (según plan nacional)